

Drůbež

drobné domácí chovy



Řešení proti mouchám, čmelíkům a dalším ektoparazitům drůbeže.

✓ MACRO-MITE (dravý roztoč)

Aplikaci produktu MACRO-MITE (dravého roztoče) je třeba sladit s četností kompletní výměny podestýlky. Aplikaci je ideální provést nejlépe **ihned**, nejpozději několik dní **po výměně podestýlky** a neměla by se provádět týden před čištěním. Aplikovat přímo na podestýlku rovnoměrně po celé délce stěn, ve větší míře do rohů a ke sloupům.

Pokud se v blízkosti nachází hnojiště aplikovat produkt MACRO-MITE jednou na začátku sezony (květen) a v půlce sezony (červenec).

✓ LAPAČ APPIBUSTER (na dospělé)

Umístění lapače Appibuster ve vzdálenosti **10-20 metrů od ubikace**. Výměna návnady probíhá jednou za **30-60 dní**. Lapač je vhodné umístit na teplé místo na slunci ve výšce cca **1,5 metru**.



MACRO-MITE
dravý roztoč

JEDNO BALENÍ: 250 m²
MÍSTO : podestýlka
APLIKACE: každé 2 až 4 týdny



LAPAČ APPIBUSTER
lapač na dospělé

JEDNO BALENÍ: 200 m²
MÍSTO : vedle kurníku (10-20 m)
APLIKACE: výměna návnady
každých 30 – 60 dní