



# Králíci

Řešení proti mouchám, prašivce králíci a dalším ektoparazitům králíků. Ochrana proti obtěžujícímu hmyzu je vhodná pro domácí chovy králíků.

## ŘEŠENÍ 1

### ✓ BIOPAR & BIOWASP (parazitické vosičky)

Aplikaci parazitických vosiček je třeba sladit s četností kompletní výměny podestýlky. Aplikaci je ideální provést nejlépe **ihned** nejpозději několik dní **po výměně podestýlky** a neměla by se provádět týden před čištěním králíkárn. **Aplikovat přímo na podestýlku** rovnoměrně po celé délce stěn, ve větší míře do rohů a ke sloupům.

## ŘEŠENÍ 2

### ✓ MACRO-MITE (dravý roztoč)

Aplikaci produktu MACRO-MITE (dravého roztoče) je třeba sladit s četností kompletní výměny podestýlky. Aplikaci je ideální provést nejlépe **ihned** nejpозději několik dní **po výměně podestýlky** a neměla by se provádět týden před čištěním. Aplikovat přímo na podestýlku rovnoměrně po celé délce stěn, ve větší míře do rohů. Pokud se blízkosti nachází hnojiště, aplikovat produkt MACRO-MITE jednou na začátku sezony (květen) a v půlce sezony (červenec).

## DOPLŇKOVÁ ŘEŠENÍ

### ✓ LAPAČ APPIBUSTER (na dospělé)

Umístění lapače Appibuster ve vzdálenosti **10-20 metrů od ubikace** zvířat. Výměna návnady probíhá jednou za **30-60 dní**. Lapač je vhodné umístit na teplé místo na slunci ve výšce cca **1,5 metru**.

### MACRO-MITE

dravý roztoč

JEDNO BALENÍ: až 200 králíků

MÍSTO: podestýlka

APLIKACE: každé 2 až 4 týdny

### BIOPAR & BIOWASP

parazitické vosičky

JEDNO BALENÍ: až 200 králíků

MÍSTO: podestýlka

APLIKACE: každé 2 až 4 týdny


### LAPAČ APPIBUSTER

lapač na dospělé

JEDNO BALENÍ: 200 m<sup>2</sup>

MÍSTO: vedle králíkárn (10-20 m)

APLIKACE: výměna návnady každých 30 – 60 dní



MACRO-MITE  
květen–červen

MACRO-MITE  
BIOPAR & BIOWASP

LAPAČ  
APPIBUSTER