



Přezimující housenka zavíječe – 0,5 cm



Dospělá housenka 3-4 cm



Dospělý motýl

Zavíječ zimostrázový (*Cydalima perspectalis*)

- Invazivní škůdce původem z Asie napadající krušpánky = zimostrázy (*Buxus*).
- V našich podmínkách má 2-3 generace ročně a bez problému přezimuje.
- Přezimující generaci housenek je třeba důkladně hlídat již od poloviny března, housenky přezimují ve stočených listech na vrcholech rostlin a s požerem začínají při teplotách kolem 8-10 °C
- Hlavní hostitelskou rostlinou je *Buxus* (zimostráz, krušpánek), housenky však mohou napadat i *Euonymus alatus*, *Euonymus japonicus* (brslen) a *Ilex purpurea* (cesmína).
- Housenky se vyskytují ve velkém množství a během několika málo dnů dokáží keř doslova zlikvidovat.
- Při prvním výskytu housenek je třeba ihned provést insekticidní postřik. Šetrnou a účinnou variantou je použití přípravku na bázi bakterie ***Bacillus thuringiensis***, která narušuje trávicí trakt housenky. Během několika desítek minut housenka přestává žrát a do 2-3 dnů hyne.
- Druhá generace housenek se objevuje kolem měsíce července, třetí generace (opět ta přezimující) potom v září.